



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz

Datum: 12. 9. 2016

č.j. : UKZUZ 100094/2016

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 8. 2016 – 31. 8. 2016

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Adiunkt 500 SC (+ další obchodní jméno Saper 500 SC)

držitel rozhodnutí o povolení: INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa,
Polsko

evidenční číslo: 5429-0

účinná látka: diflufenikan 500 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2019

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá, tritikale ozimé	chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté	0,30 l/ha	AT	1) od: 14 BBCH, do: 23 BBCH 2) do: 14 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice, tritikale	200 – 300 l/ha	postřik	1x na podzim	

Citlivé plevele: violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka objímavá, pomněnka rolní, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, víkev ptačí

Méně citlivé plevele: heřmánek nevonný, chundelka metlice, svízel přítula.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

V případě, že je nutné zlikvidovat již ošetřený porost, nepěstujte řepu, hrách (na lehkých půdách), řepku, oves ani žádné jiné brukvovité rostliny. Ostatní plodiny je možné pěstovat po zorání pozemku do hloubky 20 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí

Ihned po ukončení ošetření vyčistěte aplikační zařízení následujícím způsobem:

- vyprázdněte nádrž postřikovače, poté propláchněte všechny součásti postřikovače a opět vyprázdněte,
- naplňte nádrž postřikovače vodou s přidáním čistícího prostředku – postupujte v souladu s návodem na jeho použití, a proplachujte alespoň 10 minut při zapnutém míchacím zařízení,
- součásti postřikovače rozeberte, promyjte a propláchněte je odděleně v čistícím prostředku – v souladu s návodem na jeho použití
- propláchněte zařízení postřikovače i všechny jeho součásti čistou vodou

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Ozimá pšenice, tritikale	20	20	20	20
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
Ozimá pšenice, tritikale	10	5	5	0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Badge WG

držitel rozhodnutí o povolení: Isagro S.p.A., Caldera Business Park, Via Caldera 21, 20153 Milano, Itálie

evidenční číslo: 5180-0

účinná látka: hydroxid měďnatý 244 g/kg
oxichlorid měďnatý 245 g/kg
(celkový obsah čisté mědi 280 g/kg)

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň réвовá	1,25 kg/ha do BBCH 61	21	1) od: 13 BBCH, do: 83 BBCH	

		2,5 kg/ha od BBCH 61			
jádroviny	bakteriální spála	2,9 kg/ha	21	1) od: 03 BBCH, do: 65 BBCH a	
broskvoň, meruňka, třešeň, slivoň	moniliová hniloba	3,5 kg/ha	AT	1) od: 91 BBCH, do: 55 BBCH	
broskvoň, slivoň	kadeřavost listů broskvoně, puchrovitost	3,9 kg/ha	AT	1) od: 91 BBCH, do: 55 BBCH	
brambor	plíseň bramborová	3 kg/ha	7	1) od: 15 BBCH, do: 85 BBCH	
chmel	plíseň chmelová	7,14 kg/ha	14	1) od: 39 BBCH, do: 89 BBCH	
okrasné rostliny	houbové choroby, bakteriózy	2,7 kg/ha	--	2) při prvních příznacích choroby	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
réva	500-1000 l vody /ha (max. 500 l/ha do BBCH 61)	postřik, rosení	max. 5x / rok	7 dnů
jádroviny	700-1500 l vody /ha	postřik, rosení	max. 2x / rok	14 dnů
broskvoň, meruňka, třešeň, slivoň	1000-1500 l vody /ha	postřik, rosení	max. 4x / rok (max. 4 kg Cu/ha/rok)	14 dnů
brambor	600-800 l vody /ha	postřik	max. 4x	7 dnů
chmel	1000-2000 l vody /ha	postřik, rosení	max. 2x / rok	7-14 dnů
okrasné rostliny	600-1000 l vody /ha	postřik, rosení	max. 5x / rok	7-8 dnů

V broskvoních proti kadeřavosti listů a ve slivoních proti puchrovitosti slivoně dosahuje přípravek průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď!

Citlivost odrůd jaderovin a peckovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Všechny plodiny	50	50	50	20

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

Elegant 2 FD

držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, Jesenice, 25242 Jesenice u Prahy

evidenční číslo: 5087-0

účinná látka: florasulam 6,25 g/l

2,4-D 300 g/l

(ve formě esteru: 2,4-D-2EHE 452,4 g/l)

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2016

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizeně
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé	plevele dvouděložné jednoleté	0,6 l/ha	AT	1) od: 21 BBCH, do: 32 BBCH	
ječmen jarní	plevele dvouděložné jednoleté	0,5 l/ha	AT	1) od: 13 BBCH, do: 32 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
pšenice, ječmen, tritikale	200-400 l/ha	postřik	1x

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevely: svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, merlík bílý, penízek rolní, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, výdrol řepky.

Přípravek se aplikuje v ozimých obilninách postemergentně na jaře v růstové fázi plodiny BBCH 21-32, tj. od fáze odnožování do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka.

Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

Přípravek se aplikuje v jarním ječmeni postemergentně v růstové fázi plodiny BBCH 13-32, tj. od fáze 3. listu: 3. list rozvinutý do fáze 2. kolénka: 2. kolénko postižitelné, vzdálené min. 2 cm od 1. kolénka.

Růstová fáze plevelů: v období intenzivního růstu od 2 do 10 listů.

Následné plodiny:

V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin.

Náhradní plodiny:

V případě předčasného zrušení porostu ošetřeného přípravkem AG-FD1 306 SE lze pěstovat jako náhradní plodinu kukuřici nebo jarní obilniny po předchozí kultivaci půdy do hloubky minimálně 5 cm. Pěstování jiných náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivé jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětrí, nižší teploty). Za vysokých teplot mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení

- 1) Zcela vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a hadice čistou vodou. Znovu vyprázdněte postřikovač.
- 2) Nádrž naplňte do poloviny čistou vodou a přidejte čisticí prostředek (podle návodu na použití). Propláchněte ramena a hadice roztokem a ponechte postřikovač stát 10 minut za stálého míchání. Poté zcela vyprázdněte postřikovač.
- 3) K odstranění zbytků čisticího prostředku vypláchněte nádrž čistou vodou a propláchněte ramena a hadice.
- 4) Trysky a sítko musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
pšenice, ječmen, tritikale	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
pšenice, ječmen, tritikale	5	0	0	0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Granprotec

držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie

evidenční číslo: 5272-0

účinná látka: deltamethrin 25 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2018

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
skladované obiloviny (mimo pšenici)	korovník obilní, pilousi, poterník hnědý, lesák skladištní, lesák moučný, zavíječi	10-20 ml /t zrna	1		5) sklady, síla

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a použitím nebo spotřebou ošetřených obilnin.

Plodina, oblast použití.	Dávka vody.	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
skladované obiloviny (mimo pšenici)	0,98-0,99 l/t	postřik	1x

Dávka přípravku v rozmezí 10-20 ml/t zrna se volí dle intenzity napadení zrna škůdci.

Přípravek lze aplikovat automaticky zařízením s nízkotlakými tryskami, umístěným na dopravním zařízení uvnitř skladovacího prostoru. Ruční aplikace není dovolena.

Herbistop

držitel rozhodnutí o povolení: COMPO GmbH, Gildenstrasse 38, D-48157 Münster, Německo

evidenční číslo: 5437-0

účinná látka: kyselina pelargonová 237,59 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
drobné ovoce (mimo jahodník)	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	3	1) během vegetačního období	
drobné ovoce (mimo jahodník)	mechy, řasy	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	3	1) během vegetačního období	
nezemědělská půda, okrasné dřeviny	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	-	1) během vegetačního období	
nezemědělská půda, okrasné dřeviny	mechy, řasy	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	-	1) během vegetačního období	
okrasné rostliny	mechy, řasy	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	-		
okrasné rostliny	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	-		
travníky	mechy	9 ml/m ² 100-1000 ml vody/m ²	-	1) během vegetačního období	
zelenina	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	5		
zelenina	mechy, řasy	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	5		
ovocné dřeviny	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	3	1) během vegetačního období	
ovocné dřeviny	mechy, řasy	13 ml/m ² 87 ml vody/m ²	3	1) během vegetačního období	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
drobné ovoce (mimo jahodník)	postřik s kryty	4x	21-60 dnů
nezemědělská půda, okrasné dřeviny, ovocné dřeviny	postřik	4x	21-60 dnů
okrasné rostliny, zelenina	postřik	1x před výsadbou nebo výsevem, 2x během vegetačního období s kryty	21-60 dnů
trávníky	zálivka aplikace lokální	1x	-

Citlivé plevely:

řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý, srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha

Méně citlivé plevely:

pýr plazivý

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:

Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21-60 dnů.

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30-60 dnů.

Trávníky:

Nelze vyloučit projevy fyto toxicity na ošetřovaném trávníku. Citlivost odrůd trav konzultujte s držitelem povolení.

Ostatní plodiny:

Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny.

Děšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Herbistop AF

držitel rozhodnutí o povolení: COMPO GmbH, Gildenstrasse 38, D-48157 Münster,
Německo

evidenční číslo: 5436-0

účinná látka: kyselina pelargonová 30,99 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
nezemědělská půda	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	100 ml/m ²	-	1) během vegetačního období	
nezemědělská půda	mechy, řasy	100 ml/m ²	-	1) během vegetačního období	
okrasné rostliny	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	100 ml/m ²	-		
okrasné rostliny	mechy, řasy	100 ml/m ²	-		
zelenina	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	100 ml/m ²	5		
zelenina	mechy, řasy	100 ml/m ²	5		
ovocné dřeviny, drobné ovoce (mimo jahodník)	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	100 ml/m ²	3	1) během vegetačního období	
ovocné dřeviny, drobné ovoce (mimo jahodník)	mechy, řasy	100 ml/m ²	3	1) během vegetačního období	
okrasné dřeviny	plevele jednoděložné, plevele dvouděložné	100 ml/m ²	-	1) během vegetačního období	
okrasné dřeviny	mechy, řasy	100 ml/m ²	-	1) během vegetačního období	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
drobné ovoce	postřik aplikace lokální	4x	21-60 dnů
nezemědělská půda	postřik aplikace lokální	4x	21-60 dnů

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné dřeviny	postřik aplikace lokální	4x	21-60 dnů
okrasné rostliny	postřik aplikace lokální	1x před výsadbou nebo výsevem, 2x během vegetačního období s kryty	21-60 dnů
ovocné dřeviny	postřik aplikace lokální	4x	21-60 dnů
zelenina	postřik aplikace lokální	1x před výsadbou nebo výsevem, 2x během vegetačního období s kryty	21-60 dnů

Citlivé plevely:

řebříček obecný, merlík bílý, opletka obecná, smetanka lékařská, laskavec ohnutý, srha laločnatá, lipnice roční, lipnice luční, ježatka kuří noha

Méně citlivé plevely:

pýr plazivý

Upřesnění intervalu mezi aplikacemi:

Při postřiku proti jednoděložným a dvouděložným plevelům je interval mezi aplikacemi 21-60 dnů.

Při postřiku proti mechům a řasám je interval mezi aplikacemi 30-60 dnů.

Přípravek nesmí zasáhnout ošetřované rostliny.

Déšť 1 hodinu po aplikaci přípravku může snižovat jeho účinnost.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Keypro

držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie

evidenční číslo: 5318-0

účinná látka: cyprokonazol 100 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2022

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
pšenice ozimá	rez pšeničná,	1 l/ha	35	1) od 31 BBCH,	

	rez plevová, braničnatka pšeničná			do 69 BBCH	
--	---	--	--	------------	--

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
pšenice	200-400 l/ha	postřik	2x	21 dnů

Přípravek dosahuje proti braničnatce pšeničné průměrné účinnosti.

Listovou zeleninu je možné pěstovat nejdříve za 2 roky od poslední aplikace přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Nelze vyloučit negativní vliv na kukuřici a cukrovku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Pšenice ozimá	4	4	4	4

Proradix

držitel rozhodnutí o povolení: Sourcon Padena GmbH & Co. KG, Sindelfinger Str. 3, 72070 Tübingen, Německo

evidenční číslo: 5314-0

účinná látka: pseudomonas sp. kmen DSZM 13134 6,6 milionu ks/g

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2025

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor	kořenomorka bramborová	2 g/100 kg	AT	1) před výsadbou	4) výsadba 3 t/ha
brambor	kořenomorka bramborová	60 g/ha	AT	1) při výsadbě	4) výsadba 3 t/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Přípravek dosahuje proti kořenomorce bramborové průměrné účinnosti.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
brambor	60-80 l/ha	moření - při výsadbě	1x	-

Scala

držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Německo

evidenční číslo: 5440-0

účinná látka: pyrimethanil 400 g/l

platnost povolení končí dne: 30. 4. 2019

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jádroviny	strupovitost	1,125 l/ha (0,375 l/ha/m výšky koruny)	AT	1) do: 69 BBCH 2) podle signalizace	
réva	plíseň šedá	1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61	28	1) do: 75 BBCH 2) podle signalizace	
jahodník	plíseň šedá	2,5 l/ha	7	1) na počátku květu, nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení	

OL = ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší možný interval mezi posledním ošetřením a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
jádroviny	500-1500 l/ha (max. 500 l/ha/m výšky koruny)	postřik, rosení	3x	7-10 dnů
jahodník	max. 2000 l/ha	postřik, rosení	1x	-
réva	400-1600 l/ha (max. 800 l/ha do BBCH 61)	postřik, rosení	1x	-

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Jahody	4	4	4	4
Réva	6	6	6	6
Jádroviny	16	12	6	6

Jahody:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Jádroviny:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

Sulcotrek

držitel rozhodnutí o povolení: Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, Jesenice, 25242 Jesenice u Prahy

evidenční číslo: 5232-0

účinná látka: terbuthylazin 327 g/l

sulkotrion 173 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití.	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	2-2,2 l/ha	AT	od: 00 BBCH, do: 05 BBCH 2) preemergentně	
kukuřice	ježatka kuří noha, plevle dvouděložné jednoleté	1,75-2,2 l/ha	AT	od: 12 BBCH do: 16 BBCH 2) postemergentně max. BBCH 14	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
kukuřice	200-400 l/ha	postřik	1x

PREEMERGENTNÍ APLIKACE:**2 l/ha**

Plevle citlivé: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, mračník Theoprastův, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník, ambrozie peřenolistá, ibišek trojdílný

Plevle méně citlivé: ježatka kuří noha

2,2 l/ha

Plevle citlivé: mračník Theoprastův, laskavec ohnutý, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, ibišek trojdílný, rozrazil perský, heřmánkovec přímořský, rdesno blešník

Plevle méně citlivé: ježatka kuří noha

POSTEMERGENTNÍ APLIKACE:

1,75 l/ha

Plevele citlivé: mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník, laskavec ohnutý

Plevele méně citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský

2,0 l/ha

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, durman obecný, rdesno blešník

Plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský

2,2 l/ha

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, heřmánkovec přímořský, merlík bílý, laskavec ohnutý, mračňák Theoprastův, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, rdesno blešník, durman obecný

Plevele méně citlivé: bér sivý

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Srážky po aplikaci mohou způsobit na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny

Obilniny lze pěstovat nejdříve 7 měsíců po aplikaci. Ostatní plodiny lze pěstovat nejdříve 10 měsíců po aplikaci.

Náhradní plodiny

Po orbě lze pěstovat pouze kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky, nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- 1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).
- 2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
- 3) Opakujte postup podle bodu "2" ještě dvakrát.
- 4) Trysky a sítko musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Kukuřice	6	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
Kukuřice	15	10	5	5

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Tebseme

držitel rozhodnutí o povolení: Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie

evidenční číslo: 5257-0

účinná látka: tebukonazol 25 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2020

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmen	sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, plíseň sněžná, fuzariózy	0,12 l/100 kg	AT		4) výsevek max. 200 kg/ha
pšenice	sněti mazlavé, plíseň sněžná, fuzariózy	0,12 l/100 kg	AT		4) výsevek max. 200 kg/ha

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace
pšenice, ječmen	podle typu mořičky	moření

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.

Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.

2. NOVÉ ZAPSANÉ DALŠÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN DO ÚŘEDNÍHO REGISTRU

- rozhodnutí nebyla vydána

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Kaiso Sorbie

držitel rozhodnutí o povolení: Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter-Strasse 25, 4021 Linz,
Rakousko

evidenční číslo: 4831-1

účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/kg

platnost povolení končí dne: 30. 6. 2017

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizeně
brambor	mšice, mšice jako přenašeči viróz	0,15 kg/ha	14	2) podle signalizace	6) sadbové, konzumní
cibule	savý hmyz	0,15 kg/ha	28	2) podle signalizace	
cukrovka, řepa krmná	savý hmyz, žravý hmyz	0,15 kg/ha	28	2) podle signalizace	
hořčice	savý hmyz, žravý hmyz	0,15 kg/ha	56	2) podle signalizace	
kukuřice	bzunka ječná	0,15 kg/ha	AT	1) od 11 BBCH do 13 BBCH 2) podle signalizace	
ječmen, pšenice, žito, oves, tritikale	kohoutci, obaleč obilní, kněžice obilná, mšice jako přenašeči viróz	0,15 kg/ha	35	2) podle signalizace	
obilniny	mšice	0,1-0,15 kg/ha	AT	1) od 55 BBCH do 71 BBCH 2) podle signalizace	
peluška	savý hmyz, žravý hmyz	0,15 kg/ha	7	2) podle signalizace	6) semenné porosty
peluška, hrách setý	savý hmyz, žravý hmyz	0,15 kg/ha	7	2) podle signalizace	
řepka olejka	mšice	0,15 kg/ha	56	2) podle signalizace	
řepka olejka	dřepčík olejkový	0,15 kg/ha	56	1) na podzim, na jaře 2) podle signalizace	

řepka olejka	krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová	0,15 kg/ha	AT	1) od 60 BBCH do 65 BBCH 2) podle signalizace	
řepka olejka	krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový	0,15 kg/ha	AT	1) od 30 BBCH do 35 BBCH 2) podle signalizace	
řepka olejka	blýskáček řepkový	0,1 kg/ha	AT	1) od 50 BBCH do 55 BBCH 2) podle signalizace	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
brambor, cibule, cukrovka, hořčice, hrách, kukuřice, obilniny, peluška, řepa krmná, řepka	200-400 l/ha	postřik	max. 1x

U obilnin se aplikuje vyšší dávka z uvedeného rozpětí při silnějším výskytu mšic.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

	bez redukce	tryska50 %	tryska75 %	tryska90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice	12	6	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m]				
Řepka obilniny, brambor, cukrovka, řepa krmná, peluška, hrách cibule, hořčice, kukuřice	5	5	0	0

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Kocide 2000

držitel rozhodnutí o povolení: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18b, D-20097 Hamburg, Německo

evidenční číslo: 4510-2

účinná látka: hydroxid měďnatý 538 g/kg (350 g/kg mědi)

platnost povolení končí dne: 31. 1. 2019

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
réva	plíseň révová	1 kg/ha do BBCH 61 2 kg/ha od BBCH 61	21		
jabloň, hrušeň	strupovitost	2,5 kg/ha	AT	1) od: 00 BBCH, do: 53 BBCH	
rajče	plíseň bramborová	2 kg/ha	venku 3 skleník 7	1) od: 19 BBCH, do: 89 BBCH 2) podle signalizace	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
hrušeň, jabloň	500-1000 l/ha	postřik, rosení	3x za rok	7 dnů
rajče	400-1000 l/ha	postřik	5x	7 dnů
réva	500-1000 l/ha (500 l/ha do BBCH 61)	postřik, rosení	3x za rok	7 dnů

Přípravek dosahuje proti plísni révové v révě a proti plísni bramborové v rajčatech průměrné účinnosti.

Pozor na odrůdy citlivé na měď!

Citlivost odrůd jaderovin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
réva, jabloň, hrušeň, rajče	50	50	50	20

Maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha /rok na stejném pozemku nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků na bázi mědi.

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ DALŠÍHO PROSTŘEDKU

- rozhodnutí nebyla vydána

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)

a) rozhodnutí vydaná držiteli povolení k přípravku

Bandur

držitel rozhodnutí o povolení: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Str. 50, 40789 Monheim, Německo

evidenční číslo: 4776-0

účinná látka: aklonifen 600 g/l

platnost povolení: 31. 7. 2019

Rozsah použití přípravku:

1) rozsah povoleného použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
brambor	chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha	AT	2) preemergentně	
kukuřice	plevele dvouděložné jednoleté	1,5-2,5 l/ha	AT	1) preemergentně do 1 týdne před vzejitím 2) preemergentně	
slunečnice	chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha	AT	1) preemergentně do 1 týdne před vzejitím 2) preemergentně	
bob	chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha	AT	1) preemergentně do 1 týdne před vzejitím 2) preemergentně	
hrách krmný	chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha	AT	1) preemergentně do 1 týdne před vzejitím 2) preemergentně	6) pro výživu zvířat

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
bob, slunečnice, hrách	200-400 l /ha	postřik	max. 1x
brambor	100-600 l /ha	postřik	max. 1x
kukuřice	150-600 l /ha	postřik	max. 1x

Upřesnění podmínek aplikace:

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé:

chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční
penízek rolní, hořčice rolní, kolenec rolní, violka rolní, laskavce, výdrol řepky olejky, rozrazil, zemědělský lékařský, pětoury, merlíky, kapustka obecná, kokoška pastuší tobolka, heřmánky, kopřiva žahavka, svízel přitula, rdesna, starček obecný, lebedy, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pryšce

Plevele méně citlivé:

svízel přitula na silně humózní půdě, svlačec popínavý, kakosty a konopice v případě, že vzházejí opožděně

Růstová fáze plodin v době aplikace:

Přípravek se aplikuje po posledním přihrnování, avšak do 1 týdne před vzejitím bramboru. Po aplikaci se již nesmí provádět žádné mechanické obdělávání půdy.

brambor – odrůdy velmi rané – 100-600 l vody/ha

brambor – mimo velmi raných odrůd - 200-400 l vody/ha

kukuřice – 1,5 l/ha, *na lehké půdě*

kukuřice – 2 l/ha, *na střední půdě*

kukuřice – 2,5 l/ha, *na těžké půdě*

Kukuřice – aplikační dávky 2 a 2,5 l/ha, a slunečnice:

Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na plodinu, která má být použita pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina		bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]					
Brambor, hrách, slunečnice, bob, kukuřice		4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]					
Brambor, hrách, slunečnice, bob		30	15	10	5
Kukuřice	1,5 l/ha	10	5	5	0
	2 l/ha	15	10	5	5
	2,5 l/ha	20	10	5	5

Pro aplikaci do brambor, slunečnice, bobu a hrachu:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Pro aplikaci do kukuřice:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

2) Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení:

Menšinové použití přípravku povoleno dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cibule, česnek	plevele dvouděložné jednoleté	2,5 l/ha	AT	1) preemergentně 2) preemergentně	5) pole
cibule, česnek	plevele dvouděložné jednoleté	1,5+1 l/ha	AT	1) preemergentně + postemergentně ve f. BBCH 12	4) aplikace dělená (1,5 l/ha PRE + 1 l/ha POST) 5) pole
čočka	plevele jednoděložné jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha	AT	1) preemergentně 2) preemergentně	5) pole
lupina bílá	chundelka metlice, psárka polní, lipnice roční, plevle dvouděložné jednoleté	4 l/ha	AT	2) preemergentně	
lupina bílá	plevele dvouděložné jednoleté	2,5 l/ha	AT	2) preemergentně	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
čočka, lupina	200-400 l /ha	postřik	max. 1x
cibule, česnek	200-400 l /ha	postřik	max. 1x nebo dělená aplikace

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití.	Zákaz, omezení
cibule	nelze použít do cibule jarní (salátové)

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Cibule, česnek, čočka, lupina	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
Cibule, česnek	20	10	5	5
Čočka, lupina	30	15	10	5

Při aplikaci do čočky:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do cibule a česneku:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitéch pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Lupina:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

3) Další společné pokyny pro použití přípravku:

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitéch půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat. Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.

Na následně pěstovaných dvouděložných meziplodinách, na řepce olejce a na zeleninách nelze vyloučit poškození porostu.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BANDUR

b) nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

(nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

- rozhodnutí nebyla vydána

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)**Ortus 5 SC**

evidenční číslo: 4087-1

účinná látka: fenpyroximát 51,2 g/l

platnost povolení: od 18. 7. 2016 do 14. 11. 2016

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
sója	sviluška chmelová	1 l/ha	14	1) do 80 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
sója	200-400 l/ha	postřik	1x

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
Sója	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích ($\geq 3^\circ$ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Stutox I

evidenční číslo: 1220-2

účinná látka: fosfid zinečnatý 5 %

platnost povolení: od 15. 8. 2016 do 12. 12. 2016

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
lesní porosty, lesní školky	hraboš polní, hryzec vodní, další drobní hlodavci	5 – 10 kg/ha	-		4) vkládání do nor nebo do jedových staniček

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace
lesní porosty, lesní školky	aplikace do nor nebo jedových staniček

Přípravek NELZE aplikovat volně rozhozem!

Přípravek lze aplikovat POUZE vložení do nor nebo do jedových staniček. Při aplikaci lze použít i dávkovače.

Počáteční dávka 5 g na noru, 50 g na jedovou staničku (1 stanička na 100 m²).

Přípravek se do nor nebo staniček doplňuje po 14 dnech podle potřeby do celkové dávky na jednotku plochy.

Není-li možné areál uzavřít, pak umístěte na okraj pozemku v pravidelných rozstupech od sebe informační cedule s varováním:



NEBEZPEČÍ. Plocha se chemicky ošetřuje „čím“ (doplňt název přípravku). **VSTUP ZAKÁZÁN.**

Doplňte datum / termín do kdy nevstupovat (což je 48 hodin po aplikaci).

Doplňte název, adresu a telefonní kontakt na firmu, která ošetření provádí a zodpovídá za něj.

Aplikace je možná za suchého počasí. Neaplikovat na větší plochy bez porostu, před deštěm nebo sněžením, ihned po dešti nebo za silné rosy, na sníh nebo led.

Opětovný vstup na ošetřené pozemky pro osoby ale i domácí či hospodářská zvířata je možný až za 48 hodin po aplikaci.

Další činnost, která by spočívala ve zpracování půdy (kypření, orba, sázení apod.) v ošetřované oblasti je možné provádět až za 7 dní po aplikaci.

Stutox I

evidenční číslo: 1220-2

účinná látka: fosfid zinečnatý 5 %

platnost povolení: od 15. 8. 2016 do 12. 12. 2016

Rozsah použití přípravku:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
obilniny, olejniny, jeteloviny	hraboš polní	5 kg/ha při středním výskytu až max. 10 kg při kalamitním výskytu	-		4) vkládání do nor nebo do jedových staniček

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace
obilniny, olejniny, jeteloviny	aplikace do nor nebo jedových staniček

Přípravek NELZE aplikovat volně rozhozem!

Přípravek lze aplikovat POUZE vložení do nor nebo do jedových staniček. Při aplikaci lze použít i dávkovače.

Počáteční dávka 5 g na noru, 50 g na jedovou staničku (1 stanička na 100 m²).

Přípravek se do nor nebo staniček doplňuje po 14 dnech podle potřeby do celkové dávky na jednotku plochy.

Aplikace je možná za suchého počasí. Neaplikovat na větší plochy bez porostu, před deštěm nebo sněžením, ihned po dešti nebo za silné rosy, na sníh nebo led.

Opětovný vstup na ošetřené pozemky pro osoby ale i domácí či hospodářská zvířata je možný až za 48 hodin po aplikaci.

Další činnost, která by spočívala ve zpracování půdy (kypření, orba, sázení apod.) v ošetřované oblasti je možné provádět až za 7 dní po aplikaci.