



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

Vytvořil/telefon: Ing. Jana Ondráčková / 545 110 470

E-mail: jana.ondrackova@ukzuz.cz

Datum: 14. 4. 2020

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 3. 2020 – 31. 3. 2020

1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

Difure Solo

držitel rozhodnutí o povolení: GLOBACHEM nv., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan
2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgie

evidenční číslo: 5803-0

účinná látka: difenokonazol 250 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2021

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cukrovka, řepa krmná	rez řepná	0,5 l/ha	21	1) od 39 BBCH	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná	200-300 l/ha	postřik	2x	14 dnů

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
cukrovka, řepa krmná	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Shiro (+ další obchodní jméno Grando)

držitel rozhodnutí o povolení: UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park,
Warrington, WA3 6YN Cheshire, Velká Británie

evidenční číslo: 5497-0

účinná látka: triflusulfuron 486 g/kg

platnost povolení končí dne: 31. 12. 2021

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
cukrovka, řepa krmná	plevele dvouděložné jednoleté	30 g/ha	AT	1) od: 10 BBCH, do: 39 BBCH 2) od: 10 BBCH, do: 12 BBCH	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná	80-300 l/ha	postřik	4x	7 dnů

Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný

Plevele méně citlivé: svízel přitula, heřmánek pravý, violka rolní

Aplikujte při teplotách do 21 °C a za nižší intenzity slunečního svitu.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Vliv na kvalitativní/kvantitativní výnosové parametry řepy krmné konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny

Po sklizni řepy lze pěstovat pouze ozimé obilniny. Následující jaro je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny:

V případě zaorávky ošetřeného porostu lze do 4 měsíců po aplikaci pěstovat jarní ječmen, len na semeno, cukrovku. Po 4 měsících viz Následné plodiny.

Čištění aplikačního zařízení:

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
cukrovka, krmná řepa	4	4	4	4

Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

2. NOVÉ POVOLENÉ POMOCNÉ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

- rozhodnutí nebyla vydána

3. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ PŘÍPRAVKU

Impact

držitel rozhodnutí o povolení: Cheminova A/S, P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko

evidenční číslo: 3599-3

účinná látka: flutriafol 125 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 5. 2021

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
ječmen	padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene	1 l/ha	AT	1) od: 30 BBCH, do: 55 BBCH	
pšenice	rez plevová, rez pšeničná, braničnatka plevová	1 l/ha	AT	1) od: 30 BBCH, do: 55 BBCH	
tritikale ozimé	rez pšeničná, braničnatka plevová	1 l/ha	AT	1) od: 30 BBCH, do: 55 BBCH	
řepka olejka ozimá	plíseň šedá, alternáriová skvrnitost	1 l/ha	AT	1) od: 60 BBCH, do: 67 BBCH	

	brukvovitých, hlízenka obecná				
--	----------------------------------	--	--	--	--

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice, tritikale ozimé	150 – 300 l/ha	postřik	1x
řepka olejka ozimá	200 – 400 l/ha	postřik	1x

Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti padlí travnímu v pšenici.

Listego

držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
Německo

evidenční číslo: 4820-1

účinná látka: imazamox 40 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2025

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
slunečnice - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)	plevele jednoděložné jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	1,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 16 BBCH 2) postemergentně	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
slunečnice	100 – 300 l/ha	postřik	1x

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox.

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Spektrum účinnosti:

Plevle citlivé – lilek černý, rosička krvavá, řepaň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený

Růstová fáze plevelů:

jednoděložné – BBCH 11–13

dvouděložné – BBCH 12–14

Nelze vyloučit projevy fytoxicity na slunečnici. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny:

Lze pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu,.

Následné plodiny:

Po provedení orby je pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
slunečnice	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
slunečnice	5	5	0	0

Neudosan AF (+ další obchodní jméno Přípravek proti škůdcům)

držitel rozhodnutí o povolení: W.Neudorff GmbH. KG, An der Muhle 3, Postfach 1209,
31857 Emmerthal, Německo

evidenční číslo: 4292-0

účinná látka: draselná sůl přírodních mastných kyselin 10,2 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 8. 2021

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
okrasné rostliny, okrasné dřeviny	molice, mšice, svilušky	- podle návodu	-	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí
jádroviny	mšice mimo vlnatka krvavá	- podle návodu	-	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí
peckoviny, jahodník, bobuloviny	mšice	- podle návodu	-	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí
zelenina	molice, mšice, svilušky	- podle návodu	-	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, okrasné dřeviny, jádroviny, peckoviny, jahodník, bobuloviny	aplikace bez ředění	3x /rok	7 dnů
zelenina	aplikace bez ředění	3x	7 dnů

Ošetřete celou rostlinu včetně spodní strany listů.

Potřebné dávkování přípravku je zajištěno aplikací na rostliny do počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Před ošetřením ověřte citlivost okrasných rostlin a okrasných dřevin na menším počtu rostlin nebo na menší ploše.

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Pulsar 40 (+ další obchodní jméno Piorun, Passat)

držitel rozhodnutí o povolení: BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen,
Německo

evidenční číslo: 4820-0

účinná látka: imazamox 40 g/l

platnost povolení končí dne: 31. 10. 2025

Rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
slunečnice - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)	plevele jednoděložné jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	1,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 16 BBCH 2) postemergentně	
sója luštinatá	plevele jednoděložné jednoleté, plevle dvouděložné jednoleté	1,25 l/ha	AT	1) od: 12 BBCH, do: 16 BBCH 2) postemergentně	6) mimo množitelské porosty

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
slunečnice, sója	100 – 300 l/ha	postřik	1x

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox.

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé – lilek černý, rosička krvavá, řepaň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený

Růstová fáze plevelů:

jednoděložné – BBCH 11–13

dvouděložné – BBCH 12–14

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na slunečnici. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny:

Lze pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu, nebo sóju.

Následné plodiny:

Po provedení orby je pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
slunečnice, sója	4	4	4	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
slunečnice, sója	5	5	0	0

4. ROZŠÍŘENÍ POUŽITÍ NEBO ZMĚNA V POUŽITÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU

- rozhodnutí nebyla vydána

5. ROZŠÍŘENÉ POUŽITÍ POVOLENÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ZMĚNA V ROZŠÍŘENÉM POUŽITÍ PŘÍPRAVKU tzv. „minority“ (= menšinová použití)

nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

(nařízení vydané pro referenční přípravek platí ve stejném rozsahu i pro všechna jeho další obchodní jména)

- nařízení nebyla vydána

6. POVOLENÍ PŘÍPRAVKU PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ V OCHRANĚ ROSTLIN (tzv. výjimka na 120 dnů)

- rozhodnutí nebyla vydána