



PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

AGROXONE® 750

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, jarní pšenici, žitu setém, ozimém ječmeni, jarním ječmeni a ovsu setém.

Účinná látka : MCPA 750 g/l (jako DMA sůl 918,6 g/l)
t. j. (4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina



POZOR!
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ.
NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ OČÍ.
TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV.
ZAMEZTE STYKU S OČIMA.
PŘI ZASAZENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DÚKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKARSKOU POMOC.
PŘI STYKU S KŮŽÍ OKAMŽITĚ OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.
PŘI POŽITÍ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ : OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKARSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO OZNAČENÍ.
NEJEŽTE, NEPIJTE A NEKURTE PŘI POUŽÍVÁNÍ.



POUŽÍVEJTE VHDNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ BÝLE NEBO OBLICEJOVÝ ŠTÍT.
SP 1 ZABRAŇTE KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM.
NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY/ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A CEST.
DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Registrační číslo: 4414-1

Držitel rozhodnutí o registraci: NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Výrobce (držitel práv): NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Výrobní závod přípravku: NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Právní zástupce v ČR: F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Manínách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701

Distributor: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Balení a objem: HDPE kanystr 10 l

Čistá hmotnost: 11,7 - 12 kg

Datum expirace: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti přípravku: do data expirace uvedeného na obalu (24 měsíců od data výroby).

10 L

Po projití doby použitelnosti smí být přípravek uváděn na trh a použit v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže se na základě analýzy odpovídajícího vzorku v akreditované laboratoři prokáže, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci.

Výrobce přípravku: NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Působení přípravku :

Účinná látka přípravku působí systémově. Proniká do listových pletiv a je rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhybnutí rostlin. Účinkuje na dvouděložné jednoleté a vytrvalé plevely.

Návod na použití - indikace:

Plodina (oblast použití)	Skodlivý organismus	Dávkování l/ha	Dávka aplikační kapaliny l/ha	Ochranná lhůta	Poznámka
ječmen ozim, ječmen jarní, oves setý, pšenice ozim, pšenice jarní, žito	plevele dvouděložné	0,75 - 1,0	100-400	AT	BBCH 14 -29 max 1x

Upřesnění podmínek aplikace:

Agroxone 750 se aplikuje postemergentně, maximálně jedenkrát za vegetaci. Přípravek je možné aplikovat od fáze 4. listu do konce odnožování (BBCH 14-29). Doporučená dávka vody je 100-400 l/ha. Ošetřujte jen zdravé, mechanicky nepoškozené porosty při teplotě nad 10°C, za bezvětří a v době, kdy nehrozí mrazy a v následujících čtyřech hodinách se neočekává déšť. Přípravek aplikujte běžnými postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné dávkování podle návodu v etiketě, a to pozemně. Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Postřiková kapalina nesmí zasáhnout sousední porosty. Mimořádně citlivá je především vinná réva, která může být za vysokých teplot poškozena i výpary přípravku. V blízkosti vinic a významných přírodních společenstev ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Přípravek je možné používat v množitelských porostech.

Spektrum účinnosti přípravku:

citlivé plevely: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, penízek rolní, řepka výdrol
středně citlivé plevely: konopice polní, konopice širokolistá, mléč rolní, pcháč oset, pomněnka rolní, svačec rolní, violka rolní, violka trojbarevná
odolné plevely: heřmánky, hluchavky, pohanka svačovitá, ptačinec žabinec, rdesno blešník, rozrazil, svízel přitula, zemědým lékařský

Příprava postřikové kapaliny:


Odměněné množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:

SP1 : Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. (Necistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.)
Přípravek je toxický pro vodní organismy.
Přípravek z hlediska ochrany volně žijící zvěře nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany ptactva nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany žízála nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek z hlediska ochrany půdních mikroorganismů nevyžaduje klasifikaci.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany populace dravého rotoče Typhlodromus pyri, parazitických vosiček Aphidius rhopalosiphi, dravých zlatooček Chrysoperla carnea a dravých slídků rodu Pardosa.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5 - 35 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13).



Chraňte před mrazem, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Způsob likvidace obalů, nepoužitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod:

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čistěním plynných zplodin. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky postřikové kapaliny zředte vodou v poměru 1:10 a beze zbytku vystříkejte na ošetřeném pozemku tak, aby nemohlo dojít k zasažení zdrojů vod podzemních ani recipientů vod povrchových. Případné technologicky již nepoužitelné zbytky přípravku spalte ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek na bázi účinné látky MCPA, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- 1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), po dobu alespoň 10 minut.
- 2) Zbytek oplachové vody vypustit a celé zařízení znovu propláchnout čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přidavkem čistícího prostředku nebo sody (3 % roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
- 3) Opakujte postup podle bodu 2) ještě 2x.
- 4) Trysky a sítká musejí být čistěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Podrobnější pokyny k ochraně osob, které manipulují s přípravkem, osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP):

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití!

Při práci s přípravkem je nutné používat následující ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. **Ochrana rukou:** gumové nebo plastové rukavice označené pictogramem pro chemická nebezpečí podle ČN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. **Ochrana očí a obličeje:** není nutná. **Ochrana těla:** celkový ochranný oděv z textilního materiálu podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034 označený pictogramem "ochrana proti chemikáliím" podle ČSN EN 340. **Dodatečná ochrana hlavy:** není nutná. **Dodatečná ochrana nohou:** pracovní nebo ochranná obuv (např.: gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru do větru od postřikovače a dalších osob. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděvy a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte.

Přípravek není hořlavý. Dostane-li se do styku s ohněm, hasí se požár nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, eventuálně pískem nebo zemínou. Vodou jen v případě, kdy je zaručeno, že kontaminovaná hasební voda nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje spodních vod a recipienty vod povrchových.

Při požárním zásahu musejí být použity dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety /štítku/ příbalového letáku. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče!

Při náhodném požití: Nevypovlávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři! Podat postiženému 0,5 l vlažné vody, případně s 10 tabletami aktivního uhlí.

Při zasažení očí: při otevřených očích vyplachujte - zejména postory pod víčky - čistou, pokud možno vlahou tekoucí vodou. **Při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. **Při nadýchání:** Přerušete expozici, odveďte postiženého mimo zamořený prostor, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávající dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: tel.: 224 91 92 93, nebo 224 915 402.

® ochranná známka NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

UN 3082

látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n. (MCPA-DMA)



PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

AGROXONE® 750

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v ozimé pšenici, jarní pšenici, žitu setém, ozimém ječmeni, jarním ječmeni a ovsu setém.

Účinná látka : MCPA 750 g/l (jako DMA sůl 918,6 g/l)
t. j. (4-chlor-2-methylfenoxy)octová kyselina



POZOR!
ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ.
NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ OČÍ.
TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV.
ZAMEZTE STYKU S OČIMA.



PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE VODOU A VYHLEDEJTE LÉKARSKOU POMOC.
PŘI STYKU S KŮŽÍ OKAMŽITĚ OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.
PŘI POŽITÍ NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ : OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKARSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO OZNACENÍ.
NEJEZTE, NEPIJTE A NEKURTE PŘI POUŽÍVÁNÍ.
POUŽÍVEJTE VHDNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ BÝLE NEBO OBLICEJOVÝ ŠTÍT.
SP 1 ZABRÁNĚ KONTAMINACI VODY PŘÍPRAVKEM NEBO JEHO OBALEM.
NEČISTĚTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÉ VODY/ZABRÁNĚ KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A CEST.
DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Registrační číslo: 4414-1

Držitel rozhodnutí o registraci: NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Výrobce (držitel práv): NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Výrobní závod přípravku: NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie

Právní zástupce v ČR: F&N Agro Česká republika s.r.o., Na Manínách 7, 170 00 Praha 7, tel.: 283 871 701

Distributor: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Balení a objem: HDPE kanystr 2 x 10 l

Čistá hmotnost: 2 x 11,7 - 12 kg

Datum expirace: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti přípravku: do data expirace uvedeného na obalu (24 měsíců od data výroby).

2x10L

Po projití doby použitelnosti smí být přípravek uváděn na trh a použit v rámci podnikání pouze tehdy, jestliže se na základě analýzy odpovídajícího vzorku v akreditované laboratoři prokáže, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci.

Výrobce přípravku: NUFARM Limited, Wyke Bradford, Velká Británie