

GIBB plus



Regulátor růstu a vývoje určený pro omezení rzivosti jablek, pro zlepšení násady plodů jablek a hrušek a pro omezení poškození mrazem jádrovin a třešní.

Účinná látka

gibereliny GA₄ / GA₇, 10 g/l

Balení

1 l HDPE láhev

Výhody použití

- obsahuje růstový hormon giberelin přirozeně se vyskytující v rostlinách
- omezuje rzivost slupky plodů
- zvyšuje násadu plodů zlepšením opylení zejména při nízkém počtu květů a u triploidních odrůd
- omezuje poškození mrazem
- omezuje alternaci plodnosti
- zlepšuje kvalitu produkce a plodnost u jádrovin

Působení přípravku

Kyselina giberelová GA₄/7 patří do skupiny fytohormonů, které se přirozeně vyskytují v rostlinách. Stimuluje dělení a růst buněk a zvyšuje elasticitu buněčných stěn. Podle termínu aplikace může tato látka ovlivňovat fyziologii ovocných stromů, a tím zlepšit jejich kvalitu a plodnost.

Kapalný koncentrát GIBB Plus je vyvinutý a určený především k omezení rzivosti slupky plodů, zvýšení násady ovoce při nízkém květu, omezení poškození násady ovoce při jarních mrazech a k omezení alternaci plodnosti. Použití přípravku je vhodné při středním a nízkém květu a na triploidní odrůdy (Jonagold, Mutsu, Boskopské, Grávéštýnské).

Aplikaci přípravku provádějte v rozmezí teplot 5–25 °C, nejdříve 4 hodiny po dešti, nejlepšího účinku je možno dosáhnout, když se postřík aplikuje za teplého počasí (min. 18 °C) a při co nejvyšší vlhkosti vzduchu. Pro aplikaci je třeba volit co nejjemnější postřík, aby se dosáhlo dokonalého zvlhčení listů, pupenů a plodů. Aplikaci není vhodné realizovat za chladného nebo příliš teplého počasí. Odstup deště od aplikace přípravku je 4 hodiny.

Doporučená dávka vody:

500 litrů/ha

Mísitelnost

Aplikaci přípravku GIBB Plus je vhodné kombinovat s aplikací multifunkční pomocné látky Agrovital v dávce 0,3 l/ha (0,03 %) zejména v období bohatém na dešťové srážky.

Gibb Plus je možno společně aplikovat s běžnými fungicidy a insekticidy. Přípravek Gibb Plus nedoporučujeme kombinovat s přípravky na bázi regulátorů růstu jako je např. Ethrel (ethephon) nebo Regalis (prohexadion-Ca) a dodržovat odstup aplikace min 3–5 dnů.

Zlepšení násady plodů při nízkém květu - ošetření se provádí pouze při nízkém nasazení květů a zejména u triploidních odrůd (např. Jonagold). Ošetření se nedoporučuje provádět u diploidních odrůd při dostatečném květu (nebezpečí vysokého nasazení plodů)

Omezení poškození násady plodů jarním mrazem - ošetření se provádí co nejdříve po předchozím mrazu když teplota dosáhne alespoň 5 °C, nejpozději však do 48 hodin.



Pro snížení rzivosti slupky je vhodné začít aplikovat Gibb Plus po opadu korunních plátků

Návod k použití, dávkování

Účel použití	Dávka/ha		OL	Poznámka
	jabloň	hrušeň		
Zlepšení násady plodů při nízkém květu a u triploidních odrůd	0,3–0,6 l	0,6 l	AT	Jabloň - začátek kvetení
Omezení poškození plodů při jarních mrazech	0,5–1,2 l	0,6 l	AT	Jabloň - ihned po mrazu do 48 hodin, teplota min. 5 °C, vyšší dávka u jableoní může způsobit nižší kvalitu plodů
Snížení rzivosti slupky	Max. 1,5 l	-	AT	Po opadu korunních plátků 1–4 aplikace v postřikovém intervalu 7–10 dní 3× 0,5 l/ha u odrůd Golden, Pinova, Holsteiner Cox 3× 0,4 l/ha u odrůd Golden Reinders 3× 0,3 l/ha u odrůd Elstar, Cox 2× 0,3 l/ha u odrůd Gala, Rubinette, Discovery, Alkmene 1–2× 0,3 l/ha u odrůd Braeburn, Jonagold, Jonagored
Zlepšení kvality plodové listové růžice	0,25 l	0,25 l	AT	V růstové fázi „balon“

OL = ochranná lhůta (dny), AT je dána technologickým termínem ošetření

Snížení rzivosti slupky - rzivost vzniká v období po odkvětu s denními teplotami nad 25 °C a s nočními teplotami pod 8 °C, s nízkou relativní vlhkostí pod 60 % kdy dochází k napínání a smršťování slupky plodů což vede k tvorbě mikrotrhin a následnému korkovatení. Plody jsou

nejvíce citlivé po odkvětu na stres vlivem sucha, nízkých teplot a celkově chladné počasí podporuje rovněž tvorbu rzivosti na slupce. K omezení výše uvedených faktorů se první ošetření provádí po opadu okvětních plátků a toto ošetření se opakuje 1 až 4 × v intervalu 10 dnů.

Gibb Plus při aplikaci ve fázi „balon“ zlepšuje kvalitu plodové listové růžice



Pro stanovení dávky počtu postřiků u drůd neuvedených v tabulce platí pravidlo, že u rychle stouících odrůd používáme spíše nízké dávky a u pomalu rostoucích odrůd spíše vyšší dávky a min. 3 aplikace.

Modulace plodů - aplikace přípravku Gibb Plus má pozitivní vliv na zvětšování a prodlužování buněk, což v praxi znamená že plody jsou větší a protáhlejší a tím se zvyšuje jejich prodejnost a atraktivita pro zákazníka.



Omezení rzivosti plodů, vlevo neošetřeno, vpravo Gibb Plus.



Gibb Plus aplikace po mrazu 20. 4.



Gibb Plus plody 10. 7.



Vliv na velikost a tvar plodu, vlevo neošetřeno, vpravo Gibb Plus.