



Silný v olejninách!

**HERGIT** je pomocný rostlinný přípravek používaný jako stimulátor růstu rostlin s protistresovým účinkem. Je určen pro zvýšení kvality i výnosu semen, plodů i hlíz kulturních rostlin.

| Chemické a fyzikální vlastnosti |                                   |          |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Složení:                        | Kyselina 2-aminobenzoová          | 12,5 g/l |
|                                 | Kyselina 2-hydroxybenzoová        | 6,5 g/l  |
|                                 | Kyselina 2-amino-pentandiová/1,5/ | 6,0 g/l  |

**Obsah rizikových prvků:**  
Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky): Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely - PR, ryby - PR.

**Druh úpravy přípravku:**  
SL-Postřikový přípravek ve formě kapalného koncentráту ředitelného vodou.

**Dávkování**  
**HERGIT** se aplikuje v dávce **0,2 l/ha** zředěný při pozemní aplikaci **150 až 400 l/ha** vody, při letecké aplikaci **40 až 100 l/ha** vody. Postřik lze kombinovat s listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy a selektivními herbicidy (po konzultaci s dodavateli).

| Registrované aplikace |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Řepka olejná          | T1: od 5. pravého listu do konce dlouhivého růstu (DC 15 - 39)                 |
|                       | T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50 - 59)                               |
|                       | T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69 - 79)                         |
| Mák                   | T1: fáze 5. pravých listů až konce dlouhivého růstu (DC 15 - 39)               |
|                       | T2: první korunní plátky viditelné (počátek kvetení) až 10% kvete (DC 59 - 61) |
| Kukuřice - zrna       | T1: od fáze 6 listů do konce dlouhivého růstu ( DC 16 - 39)                    |
| Slunečnice            | T2: ve fázi počátku metání lat až konce kvetení (DC 51 - 69)                   |
|                       | T1: v období 5 listů až konce dlouhivého růstu (DC 15 - 39)                    |
| Řepa cukrová          | T2: objevení poupěte (fáze hvězdy) až plný květ (DC 51 - 65)                   |
|                       | T1: od 3.páru listů do zapojení porostu (DC 23 - 45)                           |
| Obiloviny ozimé       | T2: od 2 – 8 týdnů po zapojení porostu (DC 47 - 49)                            |
|                       | T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15 - 35)                         |
|                       | T3: po odkvětu (DC 69 - 71)                                                    |
| Obiloviny jarní       | T2: při objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 - 51)               |
|                       | T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21 - 35)                       |
|                       | T3: po odkvětu (DC 69 - 71)                                                    |
| Brambory              | T1: tvorba poupat až konec kvetení ( DC 51 - 69)                               |



ČESKÝ VÝROBEK

Hmotnost balení

10 l

Číslo rozhodnutí o registraci

2938

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

PN 01-100-07

Datum výroby



Vysoce účinný stimulátor růstu s posíleným regeneračním účinkem s prvořadým uplatněním v řepce olejné, máku a slunečnici.

**Použití mimo doporučené termíny - regenerace rostlin**

Po dlouhodobé periodě chladu i nedostatku slunečního svitu (zamokření), sucha, případně i k odstranění pesticidního šoku v kombinaci se selektivními herbicidy.  
**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.**

**Likvidace zbytků**

Zbytky postřikové jichy ani výplachové vody nesmí zasáhnout zdroje i recipienty povrchových vod. Zbytky v obalu se likvidují výplachem vodou, která se použije při následné přípravě jichy. Zbytky postřikové kapaliny se vlijí do rýhy vyhloubené na ošetřovaném pozemku a nechají se vsáknout. Obaly, použité nářadí a nástroje i ochranné pomůcky se asanují prostředky na výplach postřikovačů (např. SAGROL NF) a omyjí vodou. Prázdné obaly se recyklují.

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí. S7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený. S13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima. S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37/39 - Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

**První pomoc**

**Při požití** - vypít 0,5 l vlažné vody s 5 tabletami medicínálního uhlí  
**Při zasažení očí** - vyplachovat proudem vlažné vody po dobu 15 minut  
**Při zasažení pokožky** - odstranit zasažený oděv a pokožku omýt mýdlem a vodou  
Ve všech případech poškození zdraví je třeba postiženému zajistit lékařské ošetření.

**Podmínky skladování**

**HERGIT** se skladuje v původních dobře uzavřených obalech v suchých skladech při +5 až +30°C. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami, před přímým slunečním svitem a sálavým teplem.




**CHEMAP AGRO**



BIOSFOR  
Pardubice

Výrobce

BIOSFOR s.r.o.  
Slepotice 36, 530 02 Pardubice  
tel. 466 798 180, fax 466 798 181  
e-mail agro@chemapagro.cz, www.chemapagro.cz www.biosfor.eu





# Silný v olejninách!

### Chemické a fyzikální vlastnosti

**Obsah rizikových prvků:**

**Druh úpravy přípravku:**

## Dávkování

### Registrované aplikace



Doba použitelnosti

PN 01-100-07

**Datum výroby**



**Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.**

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci**

## První pomoc

### Podmínky skladování

**Atébrusclaf distribuito:**

 BIOSFOR  
Pardubice