

MILAGRO®

BASE LABEL

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Rizika fytotoxicity:

Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat:

Postupujte podle návodu k použití.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku:

Postupujte podle návodu k použití.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od + 5° do + 30° C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením, sáláním tepelných zdrojů a vlhkem.

Tísňové volání:

Syngenta Czech s.r.o., Praha: 222 090 411

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., +44 1484 538 444

eventuálně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout půdu.

Důležité upozornění: při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.

Bezpečnostní opatření po skončení práce:
Důkladně se omyjte (sprcha, koupele, umytí vlasů). Vyměňte si oděv. Důkladně omyjte ochranné vybavení. Kontaminované vybavení důkladně omyjte roztokem sody nebo mýdlovým roztokem.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí:
Přípravek je pro ptáky relativně neškodný při nepřekročení předepsané dávky nebo koncentrace.
Přípravek je při dodržení návodu na použití, dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny a správné aplikace přijatelný pro včely.
Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

Podmínky správného skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od + 5° do + 30° C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením, sáláním tepelných zdrojů a vlhkem.

Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení se asanuje 3% roztokem sody a propláchně vodou, nebo se použije čisticích prostředků. V případě použití čisticích prostředků postupovat dle návodu k jejich použití.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku:
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se naředí v poměru cca 1:5 s vodou

a beze zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojitupňovým spalováním s teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni a čištěním plyných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku.

Upozornění:
Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel.
Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

© Registrovaná ochranná známka společnosti Syngenta

PAGE 9

MAXIMUM TYPE AREA
131mm x 106mm

PAGE 10

MAXIMUM TYPE AREA
131mm x 93mm

7-3205-200-037-14/09 CZEC/9L

MILAGRO®

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Rizika fytotoxicity:
Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat:
Postupujte podle návodu k použití.

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a obalu po přípravku:
Postupujte podle návodu k použití.

Podmínky správného skladování:
Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od + 5° do + 30° C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením, sáláním tepelných zdrojů a vlhkem.

Tísňové volání:
Syngenta Czech s.r.o., Praha: 222 090 411
Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K.,
+44 1484 538 444

Product names marked ® or ™, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

5 litrů

syngenta®

Přípravek na ochranu rostlin

Účinná látka: 40 g/l nicosulfuron

tj.2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylkarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylnikotinamid

Registrační číslo: 3895-2

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Limited, Guildford, Velká Británie

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech s.r.o., Office Park Nové Butovice

Bucharova 1423/6, Building B, 158 00 Praha 13

Výrobce: Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Osaka, Japonsko

MAXIMUM TYPE AREA
131mm x 106mm



dráždivý



nebezpečný pro životní prostředí

Pozor!

R 38 Dráždí kůži R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání S 24 Zamezte styku s kůží

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem

(Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody) zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí

Balení a objem: 5 l HDPE kanistr

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: při skladování v neporušených originálních obalech

a dodržení stanovených podmínek skladování 2 roky od data výroby.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděn na trh. Tento

přípravek lze uvádět na trh a použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na

základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti

se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jeho registraci.

Jestliže se tyto vlastnosti neprokáží, nakládá se s odpovídajícím množstvím

přípravku jako s odpadem (zákon 185/2001 Sb., o odpadech ve znění

pozdějších předpisů).

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Použití přípravku:

Přípravek MILAGRO je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin pro

postemergentní hubení pýru plazivého, vytrvalých a jednoletých trav

a dvouděložných plevelů v kukuřici.

Nejllepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého

a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů.

Přípravek MILAGRO účinkuje proti jednoletým travovitým plevelům jako jsou

např. ježatka kuří noha, oves hluchý, béry, proso seté ve stádiu 3-4 listů, proti

vytrvalým travovitým plevelům jako jsou např. pýr plativý ve stádiu 3-4 listů,

nebo širok halepský vzcházející z rhizomů při výšce 30 cm. Jednoleté širokolisté

plevelé jako jsou např. laskavce, hořčice rolní, durman obecný, šrucha zelná

hubí ve stádiu 2-4 pravých listů.

Návod k použití - indikace:

Plodina	Škodlivý organismus	Aplikační dávka přípravku (l/ha)	Dávka aplikační kapaliny (l/ha)	Ochranná lhůta (dny)	Poznámka č.
kukuřice setá	ježatka kuří noha, plevelé jednoleté	PAGE 4	200-400	AT	1
kukuřice setá	širok halepský rostoucí z rhizomů, pýr plazivý	1,5	200-400	AT	1

Ochranná lhůta AT je dána technologickým termínem ošetření.

Poznámka č. 1:

Ošetření se provádí postemergentně. Přípravek MILAGRO se používá ve stádiu 2-4 listů (BBCH 12- BBCH 14) kukuřice seté.

Rizika fytotoxicity:

Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám.

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku se za stálého míchání vlije do nádrže

aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplní na stanovený

objem, nebo se použije předmíchávací zařízení, je-li jím aplikační zařízení

vybaveno.

Aplikace přípravku:

Přípravek MILAGRO se aplikuje postřikem běžnými polními postřikovači.

Přípravek je nutno aplikovat tak a za takových podmínek, aby byl vyloučen

únik a zasažení okolních porostů.

Používejte trysky vhodné pro postemergentní aplikaci, tj. Teejet s plochým

výstřikovým vějířem.

MILAGRO se používá ve stádiu 2-4 listů kukuřice. Ošetření v pozdějším termínu

může snížit herbicidní účinnost přípravku z důvodů zakrytí plevelů přerůstající kukuřicí.

Nejllepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého

a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů.

Herbicidní účinek může být zeslaben v případě, že aplikace byla provedena za

chladného nebo dlouhodobějšího suchého počasí nebo na zeslabený porost

kukuřice vlivem nevhodných půdních, podnebních podmínek nebo špatnou

výživou.

Následné plodiny:

a) v běžném osevním postupu a po provedené orbě je možno pěstovat pšenici

a ječmen. Výsev ostatních plodin konzultujte s firmou Syngenta,

b) v případech zaorání kukuřice, je možno bez omezení znovu zasít kukuřici;

před setím sóji musí předcházet orba. Jako následnou plodinu v tomto

případě nelze použít slunečnici, širok a brukvovité plodiny (hořčice, ředkev)

nebo bob.

První pomoc a bezpečnostní opatření na ochranu člověka a zvířat:

Při požití:

Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 litru vlažné vody.

Nikdy nedávat nic do úst pokud je postižený v bezvědomí. Nevyvolávat

zvracení. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Při nadýchání:

přerušit práci, opustit zamořený prostor, ponechat postiženého v klidu, chránit

před chladem.

Při zasažení oka:

oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a vyhledat lékaře.

Při zasažení pokožky:

odstranit potřísněný oděv, zasažená místa omýt vodou a mýdlem.

V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na

otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři! Informovat o podané první

pomoci a přípravku, s nímž postižený pracoval. V případě potřeby je možné

terapii konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,

128 08 Praha 2, telefon: 224 919 293, 224 915 402.

Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky.

Ochranné prostředky při ředění přípravku

ochrana dýchacích orgánů ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska

z filtračního materiálu (ČSN EN 149)

ochrana očí a obličeje uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166)

ochrana těla protichemický ochranný oděv z tkaného

textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369),

zástěra z PVC nebo

z pogumovaného textilu

ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk

ochrana rukou gumové rukavice (ČSN EN 374-1)

ochrana nohou gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346)

Ochranné prostředky při aplikaci postřiku

ochrana dýchacích orgánů ústenka z filtračního materiálu nebo polomaska z

filtračního materiálu (ČSN EN 149)

ochrana očí a obličeje uzavřené brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166)

ochrana těla protichemický ochranný oděv z tkaného

textilního materiálu (ČSN EN 368 a ČSN EN 369)

ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk

ochrana rukou gumové rukavice (ČSN EN 374-1)

ochrana nohou gumové nebo plastové holínky (ČSN EN 346)

Při práci a po jejím skončení až do vyslečení pracovního oděvu a důkladného

umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit.

Postřik provádějte pouze za bezvětrí nebo mírného vánku, vždy ve směru

větru od pracujících.

Přípravek není hořlavý.

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem,