LUSKOVINY

HERBICIDY - JEDNODĚLOŽNÉ A DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE

Orientační účinnost na plevele: ■■■■ specialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ slabá, □ nedostatečná, neúčinkuje

Herbicid obsah účinné látky v l (kg) přípravku Omezení Člověk,Živ. prostř.|Včely|PHO Zástupce	Termín aplikace	Luskovina	Dávka na 1 ha/ postřiková kapalina Ochranná lhůta (dny)	Ježatka kuří noha	Oves hluchý	Bažanka roční	Durman obecný	Heřmánek druh	Hluchavka druh	Hořčice polní	Chrpa polní	Kakost druh	Kokoška pastuší tobolka	Konopice polní	Laskavec druh	Lebeda druh	Lilek černý	Locika kompasová	Mák druh	Merlík druh	Mléč zelinný	Ohnice polní	Opletka obecná	Penízek rolní	Pětour druh	Ptačinec prostřední	Řdesno druh	Rozrazil druh	Řepka	Slunečnice roční	Svízel přítula	Violka rolní	Zemědým lékařský	Pelyněk černobýl	Pcháč rolní	Svlačec rolní	Šťovík druh
AFALON 45 SC 450 g linuron T,N|PR|– Agrovita	**PRE** do 3 dnů po zasetí • Dodržet hloubku setí, bob min 7 cm hluboko • Účinkuje přes kořeny a listy, reziduální účinnost 3–4 měsíce • Na lehkých půdách použít nižší dávku • Za sucha použít vyšší dávku • Na extrémně lehkých půdách se nedoporučuje použití přípravku	Hrách, bob, sója	**1,5–2,0 l/400–600 l**	■■	□	■■■	■·	■■	■■■	■■■	■■	□	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■	■■■	■·	■■■	■■■	■■■	■■	■■·	■■·	□	■	■■·	□	■■	■·	□	□
		Lupina	**2,0 l/400–600 l**																																			
Kombinace: ™ PRE 1,0–1,5 l + 0,15–0,25 l CIRRUS, COMMAND 36 CS (hrách)			™ PRE 1,0–2,0 l + 1,2 l DUAL GOLD 960 EC (hrách)																																			
ASULOX 40 400 g asulam Xi,N|PR|– Agro Aliance	**POST** při výšce hrachu a pelušky 5–15 cm, • Lokální, ohnisková aplikace proti ovsu hluchému • Oves hluchý 2.–4. list	Hrách, peluška	**4,0–5,0 l/400–600 l** OL 60	■■	■■■	□		□	□	□		□	□	□	□	□	□		□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	■■■
BASAGRAN SUPER 480 g bentazone + 150 g aktivátor Xn|PR|– BASF	**POST** při výšce bobu, hrachu 5–15 cm • Plevele 2–4 listy • Odstup deště od aplikace 6 hod.	Hrách, bob, bob s podsevem vojtěšky, jetele lučního	**1,5–2,0 l/200–600 l**	□	□	■■·	■■■	■■■	■·	■■■	■■	■■·	■■■	■■	■	■	■	■■	■	■	■	■■■	■	■■■	■■■	■■■	■·	■	■■■	■■■	■■	□	■■	■■	■	■■	□
Kombinace: NA PRE 3,3–4,1 l STOMP 400 SC, POST 1,25 l BASAGRAN SUPER			NA PRE 4,0–5,0 l STOMP 330 E, POST 1,25 l BASAGRAN SUPER																																			
BOXER 800 g prosulfocarb Xi,N|NK|– Syngenta	**PRE** do 3 dnů po zasetí (hloubka setí hrachu min. 5 cm) • Plevele děl. listy až max. 1. pár pravých listů • 1× za vegetaci	Hrách setý (nepoužívat v konzer. hrášku)	**5,0 l/300–400 l**	■■■	■	■■		■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■	■	■■	■■	■■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■■	□	■■■	■	■■■	□	□	□	□
BUTOXONE 400 400 g MCPB Xn|–|– F&N Agro	**POST** při výšce hrachu 5–15 cm • Odstup deště od aplikace 3 hodiny. Teplota při aplikaci do 25 °C. Ošetřovat 2–3 dny po dešti.	Hrách	**3,0 l/100–400 l**	□	□		■■■	■	■·	■■■		■■■	■■■	■	■■■	■■	■		■■	■■■		■■■	■■·	■■■	■■	■	■■■	■·	■■■	■	□	■	■■	■·	■■■	■	■■
CIRRUS CS 360 g clomazone Xi|–|– Dow AgroSciences	**PRE** do 3 dnů po zasetí • Na lehkých půdách spodní hranice dávkování	Hrách	**0,15–0,25 l/300–400 l**	□	□	■■		■	■■■	□	■·	□	■■■	■	■	■	■	■■	□	■■			■■	■■·	■	■■■	■■	■■·	□		■■■■	■	■■		□		
Kombinace: ™ PRE 0,15–0,25 l + 1,5 l AFALON 45 SC			™ PRE 0,15–0,25 l + 0,3–0,4 kg METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG																																			
COMMAND 36 CS 360 g clomazone Xi|–|– F&N Agro	**PRE** do 3 dnů po zasetí • Na lehkých půdách spodní hranice dávkování	Hrách	**0,15–0,25 l/300–400 l**	□	□	■■		■	■■■	□	■·	□	■■■	■	■	■	■	■■	□	■■			■■	■■·	■	■■■	■■	■■·	□		■■■■	■	■■		□		
Kombinace: ™ PRE 0,15–0,25 l + 1,5 l AFALON 45 SC			™ PRE 0,15–0,25 l + 0,3–0,4 kg METRIPHAR 70 WG, SENCOR 70 WG																																			
DUAL GOLD 960 EC 960 g S-metolachlor Xi,N|NK|– Syngenta	**PRE** do 3 dnů po zasetí	Hrách	**1,2 l/120–600 l**	■■■	■·	■	■	■·	■	■			■■·	■·	■■	■	■			■		□	■	■	■■	■	■·	■	□	□	□	■	■■	□	□	□	□
Kombinace: ™ PRE 1,2 l + 2,0 l AFALON 45 SC																																						
ESCORT 12,5 g imazamox + 250 g pendimethalin Xi|PR|– BASF	**CPOST**, hrách na zrno 3–5 cm vysoký • Jednoděl. plevele max. 1,5 listu, dvouděl. plevele max. 1. pravý list • Vysoká tolerance vůči hrachu	Hrách na zrno	**3,0–3,5 l/200–600 l**	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■		■■■	■■■		■■■	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■		□		
FRONTIER FORTE 720 g dimethenamid-P –|NK|OP II.st. BASF MP: AGRITEC	**PRE** do 3 dnů po zasetí	Sója Max. 1×	**1,2–1,4 l/300–400 l**	■■■	■	■■	■■	■■■	■■	□	□		■■	■■	■■·	■■	■■		□	■■	□	■	■	■	■■■	■■■	■	■■■	□	□	■	□	■■	□	□	□	□
METRIPHAR 70 WG 70 % metribuzin Xn,N|PR|– Arysta	**PRE** do 3 dnů po zasetí • Na lehkých půdách nižší dávka, na těžkých půdách s vyšším obsahem humusu vyšší dávka	Hrách	**0,3–0,4 kg/200–600 l**	■	□	■■	■	■■	■■	■■	■■	■·	■■	■■	■	■■	■		■■	■■	■■	■·	■	■■	■■	■■	■·	■■	■	■	□	■■	■■	□	□	□	□
Kombinace: ™ PRE 0,3–0,4 kg + 0,15–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS																																						
SENCOR 70 WG 70 % metribuzin Xn,N|PR|– Bayer	**PRE** do 3 dnů po zasetí • Na lehkých půdách nižší dávka, na těžkých půdách s vyšším obsahem humusu vyšší dávka	Hrách	**0,3–0,4 kg/200–600 l**	■	□	■■	■	■■	■■	■■	■■	■·	■■	■■	■	■■	■		■■	■■	■■	■·	■	■■	■■	■■	■·	■■	■	■	□	■■	■■	□	□	□	□
Kombinace: ™ PRE 0,3–0,4 kg + 0,15–0,25 l CIRRUS, COMMAND 36 CS																																						
STEMAT SUPER 500 g ethofumesate –|PR|– Agro Aliance	**POST** při výšce hrachu 5–15 cm	Hrách	**2,0 l**	■·	■■	■■■	■·	□	□	■		□	■·	■·	■·	■·	■		■	■	□	□	■·	□	■	■■■	■■	■·	□	□	■■■	■·	■	□	□	□	□
Kombinace: ™ POST 2,0 l + 1,25 l BASAGRAN SUPER																																						
STOMP 400 SC 400 g pendimethalin N|PR|– BASF	**PRE** do 3 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Hrách	**3,3–4,1 l/400–600 l**	■■	□	■■■	□	■■·	■■■	■■	■■	■	■■■	■■·	■■·	■■·	■■·	■■	■■■	■■■	□	■■	■■	■■■	■	■■■	■■	■■	■■	□	■■·	■■■	■■	■	□	□	□
	PRE do 3 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Fazol																																				
	PRSZ před setím se zapravením na hloubku 2–3 cm (za sucha) **CPOST** (za příznivých vlhkostních podmínek, plevele max. děl. listy, svízel do 1. př.)	Sója																																				
	PRE do 3 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Lupina bílá, lupina žlutá																																				
Kombinace: NA PRE 3,3–4,1 l, POST 1,25 l BASAGRAN SUPER			™ PRE 2,4–3,3 l + 0,15–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS (hrách)																																			
STOMP 330 E 400 g pendimethalin Xi|PR|– Agro Aliance	**PRE** do 3 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Hrách	**4,0–5,0 l/400–600 l**	■■	□	■■■	□	■■·	■■■	■■	■■	■	■■■	■■·	■■·	■■·	■■·	■■	■■■	■■■	□	■■	■■	■■■	■	■■■	■■	■■	■■	□	■■·	■■■	■■	■	□	□	□
	PRE do 3 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Fazol																																				
	PRSZ před setím se zapravením na hloubku 2–3 cm (za sucha) **CPOST** (za příznivých vlhkostních podmínek, plevele max. děl. listy, svízel do 1. př.)	Sója																																				
	PRE do 3 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Lupina bílá, lupina žlutá																																				
Kombinace: NA PRE 4,0–5,0 l, POST 1,25 l BASAGRAN SUPER			™ PRE 3,0–4,0 l + 0,15–0,25 l CIRRUS CS, COMMAND 36 CS (hrách)																																			
SUCCESSOR 600 600 g pethoxamid Xn,N|–|– AgroProtec	**PRE** do 3–5 dnů po zasetí, dobře připravená půda bez hrud	Sója	**1,5–2,0 l/200–400 l** Max. 1×	■■■	■■	■■	■·	■■■	■■■	□	■■	□	■■	■■	■■■	■■■	■·		□	■			■	■	■■■	■■	■	■■■	□	□	□	□	■	□	□	□	□
Kombinace: ™ PRE 1,5–2,0 l + 1,0–1,5 l AFALON 45 SC			™ PRE 1,5–2,0 l + 2,0 l STOMP 400 SC																																			
TROPOTOX 40 SL 400 g MCPB Xi,N|PR|PHO1 Agro Aliance	**POST** při výšce hrachu 5–15 cm • Odstup deště od aplikace 3 hodiny. Teplota při aplikaci do 25 °C. Ošetřovat 2–3 dny po dešti.	Hrách	**3,0 l/300–400 l**	□	□		■■■	■	■·	■■■		■■■	■■■	■	■■■	■■	■		■■	■■■		■■■	■■·	■■■	■■	■	■■■	■·	■■■	■	□	■	■■	■·	■■■	■	■■
Kombinace: ™ POST 3,0 l + 1,5–2,0 l BASAGRAN SUPER																																						