

Prípravky na ochranu rastlín 2014 - OPRAVA

Doplnění fungicidu ZAMIR 40 EW od spoločnosti Agrovita do pšenice ozimé

Obilniny - fungicídy

Fungicíd obsah účinnej látky v l (kg) prípravku	Obilnina	Max. počet aplikácií za vegetáciu	Povolenie v obilninách Dávka prípravku na 1 ha/postreková kvapalina Ochranná doba (dni)						Orientačná účinnosť na choroby (■■■■ špecialista, ■■■ výborná, ■■ dobrá, ■ nízka, □ slabá, neúčinkuje) Kuratívna aplikácia - aplikácia od infekcie po prejavenie príznakov choroby Protektívna, profylaktická, preventívna - aplikácia pred infekciou							
			Stebľolam <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	Múčnatka trávová <i>Blumeria graminis</i>	Septória plevová <i>Septoria nodorum</i>	Septória pšenicová <i>Septoria tritici</i>	Hrdze <i>Puccinia</i> spp.	Fuzariózy klasov <i>Fusarium</i> spp.	Pleseň snežná <i>Monographella nivalis</i>	Stebľolam <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>	Múčnatka trávová		Septórie <i>Septoria</i> spp.	Helmintosporiová škvrnitosť <i>Drechslera tritici-repentis</i>	Hrdze <i>Uredinales</i>	Fuzariózy v klasoch <i>Fusarium</i> spp.
											Stop efekt - zastavenie infekcie	Doba účinnosti				
ZAMIR 40 EW 267 g/l prochloraz, 133 g/l tebuconazole	Pšenica ozimná	2	1,0 l/250–400 l OD 42	1,0 l/250–400 l OD 42	1,0 l/250–400 l OD 42	1,0 l/250–400 l OD 42	1,0 l/250–400 l OD 42	1,0 l/250–400 l OD 42	■■■	■■■	■	■■	■■■	■■■	■■■	■■■