

	BOJOS	JERSEY	KANGOO	MALZ	PRESTIGE	SEBASTIAN	XANADU	TOLAR
Výr.oblast K, Ř, O, B	K, Ř, O	K, Ř, O	K, Ř, O	K Ř,O,B	K, Ř, (O)	Ř, O, B	(K), Ř, O	Ř, O
Výsevek MKZ/ha	3,5-4	3,5-4	3,5-4	3,5-4,5	3,5-4	3,1-3,85	3,2-3,9	3,5-4
Výnos % / kontrola	102	95	102	95	99	102	101	97
Pro dobrý výnos podpořit	produktivnost klasu	produktivnost klasu	produktivnost klasu	počet klasů, zdravotní stav, vyváženost vstupů	produktivnost klasu a zdravotní stav	počet klasů, vyváženost vstupů	počet klasů, produktivnost klasu, vyváženost vstupů	produktivnost klasu,
Výnos př.z.% kontrola/intenz.	96/101	92/90	92/102	92/97	92/99	96/100	92/106	93/88
Obsah N %	11,2	10,7	11,0	11,1	10,9	10,5	11,0	11,5
HTZ g	47	46	49	45	49	46	48	47
Výška cm	77	77	71	75	72	66	73	78
Poléhání	6	4,5	6	5	6	6	6	6
Odnožovací schopnost	střední	střední	střední	střední	nižší	vysoká	vyšší	nižší - střední
Metání dni	0	0	-1	1	-2	-1	-2	68
Zralost dni	0	0	-2	0	-2	1	-1	113
Choroby - padlí	9	9	6,5	5	9	5	9	5
- hnědá skvrnitost	6	5	6	6	3	6	6,5	6,5
- rhynchosp. skvrn.	5	5	6,5	6,5	6	5	6	7
- rez	6	4	7	5	5,5	6	5	6
- fyziolog. skvrnitost	6	7	7	5	6	7	7	7
	vysoký výnos, vyvážené prvky ale kolísají ,přepady a obsah N	přepady problém při vysokých teplotách při dozrávání, ale stabilní N, nejkratší dormance	Podporovat odnožování, nepřehřívát porost, produktivní klas	I pro teplejší oblasti, vysoká výtěžnost při dobrém zdravot. stavu, optimalizovat N hnojení	I pro sušší oblasti, Reaguje na fungicidy	Pozdní, dříve sít, vyšší dávky N o 20 kg, s intenzitou i regulátory , optimalizovat N hnojení	intenzivní, kolísavý obsah N	problém s nižším přepadem , nízký HTZ a vysok. N, optimalizovat N hnojení

9 - odolná, nepoléhavá, 1 - náchylná, poléhavá